

Physique des particules et Physique Nucléaire

PHYS-F305

Première partie: Physique des Particules

Laurent Favart

année 2025-26: BA Phys. Bloc 3

Laurent Favart

personal webpage

Home

Enseignement

Publications

Expérience H1

Expérience CMS

LHeC

Hautes Energies

Enseignement

Stages et mémoires à l'IIHE

- poster des activités et stages de l'IIHE [[pdf](#)]
- liste des sujets de [stages et mémoires IIHE](#)


Cours dispensés à l'ULB

[**PHYS-F305**] Physique des particules et Physique Nucléaire

Introduction à la physique subatomique, c'est-à-dire à la physique du noyau atomique (physique nucléaire) et celle des particules élémentaires (électrons, neutrinos, quarks, gluons,...). Le cours permet d'acquérir les connaissances fondamentales de la structure de la matière aux échelles subatomiques et des interactions fondamentales. Il donne les bases nécessaires aux cours approfondis proposés au niveau du Master en Physique.

partie I : Physique des particules :

- Notes de cours : [[Notes-PHYS-F305-202526.pdf](#)] (67 MB - version septembre 2025)
- Slides montrées durant l'année 2422523 : [Chap1.pdf](#), [Chap2.pdf](#), [Chap3.pdf](#), [Chap4.pdf](#), [Chap5.pdf](#), [Chap6.pdf](#), [Chap7.pdf](#), [Chap8.pdf](#)
- Illustrations animées interactives :



Le Cyclotron



Le Linac

	Mercredi	Vendredi
17/09/2025	cours	cours
24/09/2025	cours	cours
02/10/2025	cours	cours
08/10/2025	cours	cours
15/10/2025	TP1-1	cours
22/10/2025	TP1-2	cours
29/10/2025	tampon	tampon
05/11/2025	— — —	cours
12/11/2025	TP2-1	cours
19/11/2025	TP2-2	cours
26/11/2025	TP3-1	cours (?)
03/12/2025	TP3-2	
10/12/2025	réserve	réserve

TP donnés par Eliott Ducarme <eliott.ducarme@ulb.be>

Contenu du cours

- I. Introduction
- II. Moyens d'investigations
- III. Découverte des particules et des interactions forte et faible
- IV. Les accélérateurs
- V. Interactions particules-matière
- VI. Détection et identification des particules
- VII. Quarks et leptons : les constituants de la matière
- VIII. Modélisation des interactions fondamentales

Plan du chapitre I

I - Introduction

1. La physique des particules élémentaires
2. Structures élémentaires - de l'antiquité au XXe siècle
3. Ordres de grandeur et unités
4. Quadri-vecteurs et invariants
5. Les interactions fondamentales
6. Le Modèle Standard de la physique des particules
7. Notion de section efficace
8. Lien avec la cosmologie

Bref historique - antiquité

- grecs anciens (VI-V bc) : Anaximène, Thalès, Empédocle - 4 éléments
- atomistes (IV bc) : Leucippe, Démocrite

3 assertions :




- la matière est constituée d'**atomes** (insécables et impérissables)
- les atomes se déplacent **dans le vide**
- principe de **causalité** : tout phénomène est le résultat d'une cause
- Epicure, Lucrèce (98-55 bc):
 - tout est agencement d'atomes
 - tout ce que vous voyons, sentons, entendons est circulation d'atomes
 - ⇒ projet visant à définir une réalité appréhendable par l'homme
 - ⇒ base de l'approche scientifique

Bref historique - XVII- début XX^e


idées reprises par :

- 1661 Boyle
- 1789 Lavoisier : liste des 33 premiers éléments
- 1803 Dalton : 1^{ère} théorie atomique de la matière
- 1868 Mendeleev : propriétés chimiques périodique
- XIX : tube à décharge
- 1897 Thomson : rayonnement cathodique $\rightarrow$ q/m
- Fin XIX : radioactivité: α , β et γ
- 1909 Millikan : charge électrique de l'électron
- 1912 Hess : rayonnement cosmique

Structure de la matière



Limite optique



1 eV = énergie cinétique acquise par un électron
accéléré depuis le repos par une $\Delta V = 1 \text{ V}$

$h = 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J}$
 $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Echelles spatiale et d'énergie

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

Electronvolt


$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

kilo **keV** 10^3

Méga **MeV** 10^6

Giga **GeV** 10^9

Téra **TeV** 10^{12}




Comment atteindre de telles énergies en laboratoire ?

Les interactions

	forte	électromagnétique	faible	gravitationnelle
intensité	1	1/137	10^{-8}	10^{-40}
sensibilité	charge de couleur	charge électrique	charge faible	masse
portée (m)	10^{-15}	∞	10^{-18}	∞
particules affectées	hadrons	particules chargées	toutes sauf photon et gluons	particules massives
théorie	chromodynamique quantique (QCD)	électrofaible (EW)		relativité générale
particule médiatrice	gluon (g)	photon (γ)	$W^{\pm}$ et Z	graviton ?
exemple de réaction	$\pi^{+} + p \rightarrow \pi^{+} + p$	$\gamma + p \rightarrow \pi^{+} + n$	$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^{+} + n$	
section efficace	10 mb	20 μb	10 fb	
ex. de désintégration	$\rho \rightarrow \pi^{+} + \pi^{-}$	$\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$	$\pi^{+} \rightarrow \mu^{+} + \nu_{\mu}$	
temps de vie	10^{-23} s	10^{-16} s	10^{-8} s	

Interactions faibles




courant chargé

échange de W :
désintégration beta

instabilité des noyaux atomiques


+ désintégration du n :
force nucléaire faible



Interactions faibles


courant neutre

échange de Z^0



$$\nu_{\mu} + e^{-} \rightarrow \nu_{\mu} + e^{-}$$

Interactions fortes




collision entre ions:
échanges de gluons


Les interactions

	forte	électromagnétique	faible	gravitationnelle
intensité	1	1/137	10^{-8}	10^{-40}
sensibilité	charge de couleur	charge électrique	charge faible	masse
portée (m)	10^{-15}	∞	10^{-18}	∞
particules affectées	hadrons	particules chargées	toutes sauf photon et gluons	particules massives
théorie	chromodynamique quantique (QCD)	électrofaible (EW)		relativité générale
particule médiatrice	gluon (g)	photon (γ)	$W^{\pm}$ et Z	graviton ?
exemple de réaction	$\pi^{+} + p \rightarrow \pi^{+} + p$	$\gamma + p \rightarrow \pi^{+} + n$	$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^{+} + n$	
section efficace	10 mb	20 μb	10 fb	
ex. de désintégration	$\rho \rightarrow \pi^{+} + \pi^{-}$	$\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$	$\pi^{+} \rightarrow \mu^{+} + \nu_{\mu}$	
temps de vie	10^{-23} s	10^{-16} s	10^{-8} s	


Le modèle Standard



Masses des particules élémentaires



La section efficace



$$\sigma = \frac{\tau}{\Phi N_{cible}} \quad \frac{[s^{-1}]}{[s^{-1}][m^{-2}]} \sim [m^2]$$

τ : nombre de réactions produites par unité de temps


Φ : nombre de particules par unité de temps et par unité de surface

N_{cible} : nombre de particules dans le volume de la cible (de surface couverte par le flux)

$$1 \text{ barn} = 10^{-24} \text{ cm}^2 = 10^{-28} \text{ m}^2$$

Exemple de mesure de section efficace

Section efficace
totale



Interaction EM

Interaction Forte (IF)

Énergie dans le système du centre de masse

Variation du flux dans la cible

”probabilité” d'interaction avec les particules de la cible :

$$w = \sigma n_{cible} = \sigma \frac{N_A \rho}{A}$$

n_{cible} désigne le nombre de particules cible par unité de volume

ρ : densité volumique, N_A : nombre d'Avogadro, A : nombre atomique

probabilité que la particule interagisse dans l'épaisseur de la cible prise entre x et $x+dx$:

$$w dx = \sigma n_{cible} dx$$

Loi de variation du flux :

$$d\Phi = -\Phi w dx = -\Phi \sigma n_{cible} dx$$

$$\Phi(x) = \Phi(x_0) e^{-\sigma n_{cible} x} \quad \text{qui n'a pas interagi}$$

$$\Phi(x_0) (1 - e^{-\sigma n_{cible} x}) \quad \text{qui a interagi}$$

La luminosité

luminosité : lien entre le nombre d'événements produits et la section efficace

$$N = \int \sigma \mathcal{L} dt \qquad [\mathcal{L}] = b^{-1} s^{-1}$$


luminosité totale (ou intégrée)

$$\mathcal{L}_{Tot} = \int \mathcal{L} dt$$

	réaction type	section efficace
IF	réactions nucléaires	1 b
	$p + n \rightarrow X$	40 mb
EM	$\gamma + p \rightarrow X$	20 μ b
	$\gamma + \gamma \rightarrow X$	0.5 μ b
	$e^+ + e^- \rightarrow X$	100 nb
Higgs	$p + p \rightarrow H + X$	10 pb
If	$\nu + p \rightarrow X$	10 fb

m	10^{-3}
μ	10^{-6}
n	10^{-9}
p	10^{-12}
f	10^{-15}

Lien avec la cosmologie



Formation des atomes

photons échappent
CMB 3K

Formation des noyaux
D, He, Li

Formation des hadrons

disparition anti-
quarks

Brisure électro-faible

Création de particles
par paires

inflation

MeV

GeV

TeV